

Información
para el
paciente



Extracción del diente

Elige sonreír: Tus opciones
después de la pérdida de
un diente

leading regeneration


Geistlich

Causas

¿Qué motivos hay para extraer un diente?



Enfermedad subyacente de la encía



Problemas de endodoncia



Accidentes

Hay muchos motivos por los cuales sería necesario extraer un diente. Sea cual sea el motivo de la extracción dental, puedes elegir el procedimiento que mejor se adapte a tus objetivos y tu presupuesto.

Preservación del hueso

¿Qué ocurre tras la extracción del diente?

La extracción dental deja un pequeño orificio, llamado alveolo, en el hueso mandibular, que hará que, con el tiempo, se reabsorba el hueso circundante: se trata de un proceso natural. Sin embargo, sin tratamiento, esta pérdida del volumen óseo podría comprometer el éxito de los implantes o de puentes fijos o removibles. Para evitarlo, tu dentista utilizará algunos procedimientos para asegurarse de que haya hueso suficiente para soportar el implante dental o el puente.


1. Sustitución inmediata

Cuando se pone un implante inmediatamente después de la extracción del diente, el espacio que lo rodea se rellena con un material de relleno óseo para estabilizar el implante y evitar la pérdida de hueso. Con el tiempo, el injerto óseo se integra en el hueso mandibular. Esta opción no se aconseja en todos los casos, en especial si las paredes óseas son finas o están dañadas o si la encía es delgada.

¿Cuánto se puede tardar en reponer un diente perdido?

Dependiendo de tu estado médico y de tus necesidades, los implantes dentales pueden insertarse inmediatamente después de extraer el diente o unos meses más tarde.

Sin embargo, no importa lo que tú o tu dentista decidáis para reponer el diente, hay algo que es extremadamente importante: se necesita una base estable en el hueso subyacente. Solo entonces el implante se mantendrá estable en los próximos años. Como consecuencia, tu dentista decidirá si es necesario crear hueso nuevo alrededor del implante dental.



2. Sustitución diferida

Algunos dentistas prefieren esperar antes de poner un implante. Esto da tiempo al alveolo de cicatrizar. Cuando llega el momento de colocar el implante tienen que evitar que la pérdida de volumen del hueso aumente. La posible pérdida de hueso se compensa introduciendo un relleno óseo y una membrana protectora. Este procedimiento se conoce como regeneración ósea guiada, y es muy frecuente.

¿Cómo puede el paciente colaborar para su recuperación?

Qué hacer

- > Sigue el consejo de tu dentista.
- > Mantén una correcta higiene bucal, aunque no deberías cepillar la zona quirúrgica con un cepillo de dientes durante un tiempo.
- > Utiliza un enjuague bucal antibacteriano, según te haya prescrito tu dentista.
- > Trata la inflamación aplicando compresas frías húmedas.
- > Consulta con tu dentista si tienes dolor.
- > Asegúrate de acudir a la cita de seguimiento con tu dentista.

Qué no hacer

- > No descuides tu higiene bucal.
- > No te cepilles ni uses el hilo dental en el lugar de la intervención quirúrgica durante la primera semana. Generalmente, los dientes próximos a la zona pueden limpiarse utilizando un cepillo de cerdas ultrablandas.
- > No bebas café ni alcohol ni fumes durante los dos o tres días posteriores a la cirugía.

3. Sin sustitución pero previniendo la pérdida de hueso

Después de la extracción dental se puede introducir un material de relleno óseo en el alveolo.

Este abordaje se usa para mantener el volumen y el hueso del borde, lo cual evita una reconstrucción más complicada del hueso en el futuro. El paciente decide entonces si remplazar el diente perdido con un implante, u optar por un puente dental fijo o removible.

Preguntas frecuentes

¿Qué otras preguntas hacen los pacientes?

1. ¿De qué están hechos los biomateriales?

Los biomateriales Geistlich están elaborados con hueso bovino o colágeno porcino, o una combinación de ambos en algunos casos.

2. ¿Hay riesgo de rechazo o de reacción alérgica?

Los pacientes toleran muy bien los biomateriales Geistlich, pero debes consultar con tu dentista si tienes alergia al colágeno.

3. ¿El procedimiento es doloroso?

Los procedimientos quirúrgicos se realizan con anestesia local. Si tuvieras dolor, el dentista aumentaría la dosis del anestésico.

4. ¿Puedo volver al trabajo al día siguiente?

Sí. Sin embargo, es mejor evitarlo durante al menos dos días si tu trabajo implica actividades físicas intensas.

5. ¿Cuánto tiempo tarda en cicatrizar?

El tiempo depende de cada paciente. Normalmente, la cicatrización inicial de la herida tarda de 7 a 10 días.

Sitio web para los pacientes

Obtén más información sobre la extracción del diente.



Geistlich Pharma

¿Cuáles son las ventajas de los biomateriales Geistlich?



Productos suizos de alta calidad



Cada 14 segundos se usa un producto Geistlich



Se ha demostrado científicamente en más de 1400 publicaciones



Más de 15 millones de pacientes tratados con éxito en todo el mundo



Control estricto del proceso de fabricación

Geistlich

Fabricante

Geistlich Pharma AG
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen
Suiza
Teléfono +41 41 492 55 55
info@geistlich.com
www.geistlich-pharma.com

Información adicional sobre
nuestros distribuidores:
www.geistlich-dental.com



 **swiss made**

602316/2306/es © 2023 Geistlich Pharma AG – Sujeto a modificaciones